



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

*Attività Libero Professionale Intra-Moenia*

**Dott. Marco MASINA**

Direttore Unità Operativa Geriatria

Ospedale di Bentivoglio AUSL Bologna

Telefono studio 051 6644394 – reparto 6644490 -

23/08/2018

Egregio collega,

ho visitato la tua assistito sig.r/ra **BONDANELLI ANNA** nato/a il 16/01/1946

**In anamnesi:** separata - ha tre figli e vive con una figlia – scolarità 5 anni

- Obesità
- Ipertensione arteriosa (Blopess + altro farmaco)
- Russamento
- Diabete mellito di tipo II (glicemia a digiuno 140 mg in terapia con metformina)

**Motivo della visita:** negli ultimi tre anni la figlia ha notato un disorientamento temporale e una perdita delle autonomie (dipendenza delle IADL) con deliri di furto-documento ed abbandono. Negli ultimi tempi ha ridotto il contatto con le altre persone. Esce di casa solo accompagnata. Valutata presso il Centro Disturbi cognitivi Lunardelli con diagnosi di sospetto Disturbo cognitivo maggiore; MMSE 14/30 - prescritto Trittico + Paroxetina che però ha rifiutato di assumere dopo poco tempo mentre preferisce assumere Minias come ipnotico. Visita di controllo a giugno 2019.

**Obiettività:** severa obesità - Vigile – organizza il pensiero in maniera difensiva – dichiara di essere in grado di svolgere le attività domestiche ma che avendo 3 figlie preferisce delegarle – non deficit piramidali – non rigidità extrapiramidale – Toni validi – impurità sistolica – PA 130/80– FC 70 /min non segni di scompenso – non soffi carotidei – durante il colloquio emerge una facile ittitabilità TC cerebrale (01/06/18): spazi sub aracnoidei della convessità fronto-temporale specie a sinistra – ateromasia dei sinifoni carotidei.

Il MMSE di Folstein ha dato un punteggio corretto per età-scolarità di 14/30 (invariato) con errori nell'orientamento ts, attenzione calcolo, richiamo mnesico, esecuzione ordine scritto, scrittura di frase, prassia costruttiva.

**Sul piano funzionale** peggioramento della autonomia per le ADL (in particolare ha ridotto la cura della persona lavandosi meno del necessario e rifiutando l'aiuto delle figlie; si veste e gestisce l'igiene personale in maniera ancora adeguata; si sposta accompagnata ma raramente da sola; non incontinenza; si alimenta da solo.( punteggio 4/6) - Difficoltà nelle attività strumentali che ha delegato (IADL 2/8) ; non i grado di andare in banca né di gestire il telefonino.

**Conclusione :** *Disturbo cognitivo maggiore con aspetti suggestivi di tipo frontale* (anche in considerazione del quadro TC).

Consiglio iniziare con : Sertralina 50 mg ½ cp al mattino per una settimana poi aumentare a 1 cp/mattina

Utile evitare l'isolamento mediante affiancamento di una figura di fiducia